

Прикладная статистика 15. Последовательный анализ.

20 декабря 2013 г.

Z-критерий для доли


выборка: $X^n = (X_1, \dots, X_n), X_i \sim Ber(p);$

нулевая гипотеза: $H_0: p = p_0;$

альтернатива: $H_1: p > p_0;$

статистика: $Z(X^n) = \frac{\hat{p} - p_0 - \frac{1}{2n}}{\sqrt{\frac{p_0(1-p_0)}{n}}}, \quad \hat{p} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i;$

$Z(X^n) \sim N(0, 1)$ при $H_0;$



достигаемый уровень значимости:

$$p(z) = 1 - ncdf(z, 0, 1).$$

Z-критерий для доли


выборка: $X^n = (X_1, \dots, X_n), X_i \sim Ber(p);$

нулевая гипотеза: $H_0: p \leq p_0;$

альтернатива: $H_1: p > p_0;$

статистика: $Z(X^n) = \frac{\hat{p} - p_0 - \frac{1}{2n}}{\sqrt{\frac{p_0(1-p_0)}{n}}}, \quad \hat{p} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i;$

$Z(X^n) \sim N(0, 1)$ при $p = p_0$ (наименее благоприятная конфигурация);



достигаемый уровень значимости:

$$p(z) = 1 - ncdf(z, 0, 1).$$

Z-критерий для доли

Пример: рекламная кампания планировалась так, чтобы обеспечить узнаваемость продукта среди целевой аудитории более 30%. После окончания кампании проводится опрос с целью оценки узнаваемости.

H_0 : узнаваемость продукта не превышает 30%.

H_1 : узнаваемость продукта превышает 30%.

Как выбрать наименьший достаточный объём выборки?

Например, если истинная узнаваемость составляет 35%, то при уровне значимости 0.05 для обеспечения мощности 0.8 нужно опросить 534 человека.

Постановка задачи последовательного анализа

выборка: $X^m = (X_1, \dots, X_m), X_i \sim Ber(p)$.

Фиксируем «коридор» отклонений значения параметра p от p_0 , которые можно считать несущественными:

$$p_L \leq p_0 \leq p_U$$

(хотя бы одно из неравенств — строгое).

нулевая гипотеза: $H_0: p \leq p_L;$
альтернатива: $H_1: p \geq p_U.$

Пусть данные поступают постепенно.

Задача: построить проверку гипотез так, чтобы обойтись как можно меньшим объёмом выборки.

Процедура последовательного анализа

Поскольку размер выборки не фиксирован, мы можем фиксировать вероятности ошибок обоих родов:

α — уровень значимости — допускаемая вероятность ошибки первого рода,
 β — допускаемая вероятность ошибки второго рода.

$$\text{статистика: } d_m(X^m) = \sum_{i=1}^m X_i.$$

Введём следующие обозначения:

$$A = \frac{1 - \beta}{\alpha}, \quad B = \frac{\beta}{1 - \alpha},$$


$$a_m = \frac{\ln B + m \ln \frac{1-p_L}{1-p_U}}{\ln \frac{p_U}{p_L} - \ln \frac{1-p_U}{1-p_L}},$$

$$r_m = \frac{\ln A + m \ln \frac{1-p_L}{1-p_U}}{\ln \frac{p_U}{p_L} - \ln \frac{1-p_U}{1-p_L}}.$$

Процедура последовательного анализа

При каждом значении m :

- $d_m \geq r_m \Rightarrow$ отвергаем H_0 , $p \geq p_U$;
- $d_m \leq a_m \Rightarrow$ принимаем H_0 , $p \leq p_L$;
- $a_m < d_m < r_m \Rightarrow$ процесс продолжается, добавляем элемент выборки.



Момент остановки

На каком элементах выборки n произойдёт остановка процедуры?


n — случайная величина, можно говорить о её матожидании:

$$\mathbb{E}_p(n) = \frac{L(p) \ln B + (1 - L(p)) \ln A}{p \ln \frac{p_U}{p_L} + (1 - p) \ln \frac{1 - p_U}{1 - p_L}},$$

$$L(p) = \frac{A^h - 1}{A^h - B^h},$$

h определяется как решение уравнения:


$$p = \frac{1 - \left(\frac{1 - p_U}{1 - p_L}\right)^h}{\left(\frac{p_U}{p_L}\right)^h - \left(\frac{1 - p_U}{1 - p_L}\right)^h}.$$



Усечение

Если при $m = n_0$ решение ещё не принято, но возможности добавлять элементы выборки больше нет, используем следующий критерий:

- $d_m \geq \frac{a_{n_0} + r_{n_0}}{2} \Rightarrow$ отвергаем H_0 , $p \geq p_U$;
- $d_m \leq \frac{a_{n_0} + r_{n_0}}{2} \Rightarrow$ принимаем H_0 , $p \leq p_L$.



Группировка наблюдений

Наблюдения могут поступать группами g_1, g_2, \dots по v элементов. Тогда значения статистики d_m сравниваются с a_m, r_m только при $m = v, 2v, \dots$.

Последствия:

- увеличивается размер выборки, при котором происходит остановка;
- истинные вероятности ошибок могут оказаться больше номинальных, но при этом

$$\alpha' \leq \frac{\alpha}{1 - \beta}, \quad \beta' \leq \frac{\beta}{1 - \alpha}.$$

Так как величины α и β обычно малы, отклонением можно пренебречь.

Z-критерий для двух долей

выборки: $X_1^{n_1} = (X_{11}, \dots, X_{1n_1}), X_{1i} \sim Ber(p_1);$


$X_2^{n_2} = (X_{21}, \dots, X_{2n_2}), X_{2i} \sim Ber(p_2);$

нулевая гипотеза: $H_0: p_1 \geq p_2;$

альтернатива: $H_1: p_1 < p_2;$

статистика: $Z(X_1^{n_1}, X_2^{n_2}) = \frac{\hat{p}_1 - \hat{p}_2}{\sqrt{P(1-P)\left(\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}\right)}}, \quad P = \frac{\hat{p}_1 n_1 + \hat{p}_2 n_2}{n_1 + n_2};$

$Z(X_1^{n_1}, X_2^{n_2}) \sim N(0, 1)$ при $p_1 = p_2$ (наименее благоприятная конфигурация);



достигаемый уровень значимости:

$$p(z) = 1 - ncdf(z, 0, 1).$$

Z-критерий для двух долей

Пример: имеются два технологических процесса, классический и модернизированный, p_1, p_2 — доли брака в них.

H_0 : доля брака в классическом процессе не меньше доли брака в модернизированном.

H_1 : доля брака в классическом процессе меньше доли брака в модернизированном.

Аналог в последовательном анализе

Пусть значения x_{1i}, x_{2i} поступают парами.

Будем рассматривать только различающиеся пары — $(0, 1)$ и $(1, 0)$, а остальные будем отбрасывать.

$$k_1 = \frac{p_1}{1-p_1}, \quad k_2 = \frac{p_2}{1-p_2} \text{ — риски,}$$

$$u = \frac{k_2}{k_1} = \frac{p_2(1-p_1)}{p_1(1-p_2)} \text{ — относительный риск:}$$

- $u = 1 \Leftrightarrow p_1 = p_2,$
- $u > 1 \Leftrightarrow p_1 > p_2,$
- $u < 1 \Leftrightarrow p_1 < p_2.$

Фиксируем «коридор» отклонений u от 1, которые можно считать незначимыми:

$$u_L \leq 1 \leq u_U$$

(хотя бы одно из неравенств — строгое).

нулевая гипотеза: $H_0: u \geq u_U;$

альтернатива: $H_1: u \leq u_L;$

статистика: $d_m(X_1^m, X_2^m) = \sum_{i=1}^m (1 - X_{1i}) X_{2i}.$

Аналог в последовательном анализе

Константы последовательного анализа:

$$a_m = \frac{\ln B + m \ln \frac{1-u_U}{1-u_L}}{\ln u_U - \ln u_L},$$

$$r_m = \frac{\ln A + m \ln \frac{1-u_U}{1-u_L}}{\ln u_U - \ln u_L}.$$

Момент остановки:

$$\mathbb{E}_u(n) = \frac{L(u) \ln B + (1 - L(u)) \ln A}{\frac{u}{u+1} \ln \frac{u_U(1+u_L)}{u_L(1+u_U)} + \frac{1}{u+1} \ln \frac{1+u_L}{1+u_U}} \left/ (p_1(1-p_2) + p_2(1-p_1)), \right.$$

$$L(u) = \frac{A^h - 1}{A^h - B^h},$$

h определяется как решение уравнения

$$\frac{u}{u+1} = \frac{1 - \left(\frac{1+u_L}{1+u_U}\right)^h}{\left(\frac{u_U(1+u_L)}{u_L(1+u_U)}\right)^h - \left(\frac{1+u_L}{1+u_U}\right)^h}.$$

Группировка наблюдений

Наблюдения могут поступать группами g_1, g_2, \dots пар выборок по v элементов. Если при этом внутри пар выборок не указаны соответствия элементов (x_{1i}, x_{2i}) , статистику d_m вычислить невозможно.

Пусть $v_1(g_i)$ — число успехов в выборке из v наблюдений над первой биномиальной совокупностью в группе g_i , $v_2(g_i)$ — над второй. Тогда для этой пары групп в качестве оценки числа пар $(0, 1)$ примем величину $v_2(g_i) - \frac{v_1(g_i)v_2(g_i)}{v}$.

$$d_{g_m} = \sum_{i=1}^{g_m} \left(v_2(g_i) - \frac{v_1(g_i)v_2(g_i)}{v} \right).$$

Последствия: аналогичные.

Z-критерий для среднего нормального распределения, односторонняя альтернатива


выборка: $X^n = (X_1, \dots, X_n)$, $X_i \sim N(\mu, \sigma^2)$, σ известна;

нулевая гипотеза: $H_0: \mu \leq \mu_0$;

альтернатива: $H_1: \mu > \mu_0$;

статистика: $Z(X^n) = \frac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}}$;

$Z(X^n) \sim N(0, 1)$ при $\mu = \mu_0$ (наименее благоприятная конфигурация);



достигаемый уровень значимости:

$$p(z) = 1 - ncdf(z, 0, 1).$$

Z-критерий для среднего нормального распределения, односторонняя альтернатива

Пример: при помощи прибора с известной погрешностью σ измеряется концентрация вредного вещества в образце. Необходимо проверить, что она не превышает предельно допустимой.

Аналог в последовательном анализе

Фиксируем «коридор» отклонений μ от μ_0 , которые можно считать незначимыми:

$$\mu_L \leq \mu_0 \leq \mu_U$$

(хотя бы одно из неравенств — строгое).

нулевая гипотеза: $H_0: \mu \leq \mu_L;$

альтернатива: $H_1: \mu \geq \mu_U;$

статистика: $d_m(X^m) = \sum_{i=1}^m X_i.$

Аналог в последовательном анализе

Константы последовательного анализа:

$$a_m = \frac{\sigma^2}{\mu_U - \mu_L} \ln B + m \frac{\mu_U + \mu_L}{2},$$

$$r_m = \frac{\sigma^2}{\mu_U - \mu_L} \ln A + m \frac{\mu_U + \mu_L}{2},$$

Момент остановки:

$$\mathbb{E}_\mu(n) = \frac{L(\mu) \ln B (1 - L(\mu)) \ln A}{\mu_L^2 - \mu_U^2 + 2(\mu_U - \mu_L)\mu},$$

$$L(\mu) = \frac{A^h - 1}{A^h - B^h},$$

$$h = \frac{\mu_U + \mu_L - 2\mu}{\mu_U - \mu_L}.$$

Z-критерий для среднего нормального распределения, двусторонняя альтернатива


выборка: $X^n = (X_1, \dots, X_n)$, $X_i \sim N(\mu, \sigma^2)$, σ известна;

нулевая гипотеза: $H_0: \mu = \mu_0$;

альтернатива: $H_1: \mu \neq \mu_0$;

статистика: $Z(X^n) = \frac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}}$;

$Z(X^n) \sim N(0, 1)$ при H_0 ;



достигаемый уровень значимости:

$$p(z) = 2(1 - ncdf(|z|, 0, 1)).$$

Z-критерий для среднего нормального распределения, двусторонняя альтернатива

Пример: многократные измерения прибором с известной погрешностью для проверки наличия у прибора смещения.

Аналог в последовательном анализе

Фиксируем симметричный «коридор» отклонений μ от μ_0 , которые можно считать незначимыми:

$$\left| \frac{\mu - \mu_0}{\sigma} \right| \leq \delta.$$

нулевая гипотеза: $H_0: \left| \frac{\mu - \mu_0}{\sigma} \right| \leq \delta;$
альтернатива: $H_1: \left| \frac{\mu - \mu_0}{\sigma} \right| > \delta;$

статистика: $d_m(X^m) = \ln \operatorname{ch} \left(\frac{\delta}{\sigma} \sum_{i=1}^m (X_i - \mu_0) \right).$

Константы последовательного анализа:

$$a_m = \ln B + m \frac{\delta^2}{2},$$

$$r_m = \ln A + m \frac{\delta^2}{2}.$$

Критерий хи-квадрат


выборка: $X^n = (X_1, \dots, X_n)$, $X_i \sim N(\mu, \sigma^2)$, μ известно;

нулевая гипотеза: $H_0: \sigma \leq \sigma_0$;

альтернатива: $H_1: \sigma > \sigma_0$;

статистика: $\chi^2(X^n) = \frac{(n-1)S^2}{\sigma_0^2}$;

$\chi^2(X^n) \sim \chi_{n-1}^2$ при $\sigma = \sigma_0$ (наименее благоприятная конфигурация);



достигаемый уровень значимости:

$$p(\chi^2) = 1 - chi2cdf(\chi^2, n - 1).$$

Биномиальное распределение
ooooooooo

Нормальное распределение
oooo●oo

Критерий хи-квадрат

Пример: не превышает ли погрешность прибора заявленного уровня?

Аналог в последовательном анализе

Фиксируем «коридор» отклонений σ от σ_0 , которые можно считать незначимыми:

$$\sigma_L \leq \sigma_0 \leq \sigma_U$$

(хотя бы одно из неравенств — строгое).

нулевая гипотеза: $H_0: \sigma \leq \sigma_L$;

альтернатива: $H_1: \sigma \geq \sigma_U$;

статистика: $d_m(X^m) = \sum_{i=1}^m (X_i - \mu)^2$.

Константы последовательного анализа:

$$a_m = \frac{2 \ln B + m \ln \frac{\sigma_U^2}{\sigma_L^2}}{\frac{1}{\sigma_L^2} - \frac{1}{\sigma_U^2}},$$

$$r_m = \frac{2 \ln A + m \ln \frac{\sigma_U^2}{\sigma_L^2}}{\frac{1}{\sigma_L^2} - \frac{1}{\sigma_U^2}}.$$

Случай неизвестного среднего

Если среднее неизвестно, предлагается использовать его выборочную оценку:

$$\text{статистика: } d_m(X^m) = \sum_{i=1}^m (X_i - \bar{X})^2.$$

При этом в последовательном анализе на m -м шаге вместо констант a_m, r_m необходимо использовать a_{m-1}, r_{m-1} .

Прикладная статистика
15. Последовательный анализ.

Рябенко Евгений
riabenko.e@gmail.com